

济作物有棉、麻、油、瓜、蔗、菜、药等八大类。受地貌和植被的影响，构成各区域畜牧业的特点是：南部低山丘陵以猪、牛饲养为主；中部河谷、水网平原以猪、禽饲养为主；北部滨海以山羊、长毛兔饲养为主。

三、气候、水文和自然灾害

本县属亚热带季风气候区，全年平均气温 16.5°C ，平均积温 5247.7°C ，无霜期238天，终霜期平均在3月29日，年降雨量1395.4毫米，雨日156天，年日照时数1963.2小时，年总辐射量107.2千卡/平方厘米。气候特点是：1、2月份是隆冬季节，极端最低气温 -10.5°C ，3月份气候开始呈波状回升，但有“倒春寒”和晚霜的威胁，同时出现春雨，平均雨量227.9毫米，占全年总雨量的16.3%。5月份为春夏交替，5月底进入夏季，5、6月属梅雨季节，雨量358.2毫米，占全年总雨量的25.6%。7、8月份为盛夏季节，气温为全年最高，最高气温 39.0°C 。晴热少雨。9月份气温开始下降，是我县第二个雨期，月雨量占全年的12%。10月份一般为秋高气爽，多晴天。11月冷空气势力逐渐加强，侵袭频繁，气温下降，11月下旬进入冬季至次年2月。综上所述，我县气候温和润湿，四季分明，光热同步，雨量充沛，有利于自然生物资源的繁衍发展。但自然灾害也较频繁，影响较大的有台风、干旱、洪涝、春秋季节低温阴雨、冰雹、大风和寒潮、霜冻等。历年台风影响平均每年3次，最多达7次，影响月份以7~9月为最多，占影响台风总数的85.2%。干旱年频率在60~80%，即十年6~8遇，特大干旱频

率10%，即10年一遇。洪涝分梅雨涝和台季涝，梅季小涝机率在20~30%左右，即十年2~3遇，小中涝机率各为10.3%。全县台季涝机率41.3%，即五年二遇，中、大涝机率24.1%，近四年一遇。强冷空气平均每年5次，其中3、4月份出现次数最多，平均每年霜冻50天左右，历年 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 高温平均20天，冰雹多出现在4~6月，平均十年一遇。

水是人类和一切生物赖以生存而不可缺少的一项自然资源，上虞地形多样，水源充足，曹娥江是我省八大河流之一，贯穿南北，平原及人工挖掘河道有四十里河、十八里河、姚江、虞甬运河、肖绍运河、百沥河、百松河、盖谢河、盖沥河等，较大的湖泊有：皂里湖、白马湖、小越湖、产万湖、西溪湖、康家湖等。

四、野生动物

上虞野生动物有兽类、爬行动物及鸟类。据老年人回忆，解放前山区出现过虎、豺、豹等猛兽，现有野山羊、野猪、黄鼠狼、貉子、狸子、小灵猫、松鼠、草狐、狼、黄獾等26种，与畜禽疫病关系较大的有各种鼠类、黄鼠狼、麻雀、燕子、水鸭、雉鸡、鱼、蛙、蚊蝇、牛虻、虱、蚯蚓、蜗牛、水蛭等。