

十、猪弓形体病

猪弓形体病是由猪弓形体血原虫引起的传染性寄生虫病。本病对犬、猫等多种动物能带虫感染。1980年上虞有猪弓形体病的提法。但临床上似与猪瘟病例相混淆。以后有个别病例报告：1984年皂湖乡明星村陈志苗户，一窝仔猪12头，有5头发病，体温40°C以上高热稽留，食欲减少。用青、链霉素治疗无效，3头死亡。剖检病尸，肠系膜淋巴结肿大充血，切面灰白色，形如绳索状。兽医诊断为猪弓形体病。另2头用增效磺胺治疗3—4天后痊愈。

猪弓形体病发病率很低，但感染率较高。1988年11月在全市疫病普查中对上虞4个国营农牧场151头公母猪血清经绍兴市畜牧兽医站化验室血凝反应检测结果，阳性34头，占22.5%。可疑11头。（见附表）

1988年国营集体农牧场公母猪弓形体血凝反应结果表

单位：头、%

单 位	送 检	+	+ -	-	阳性率%
县良种场	83	9	2	72	10.8%
县畜牧场	34	21	9	4	61.8%
县棉种场	28	4		24	14.3%
县改良站	6			6	
合 计	151	34	11	106	22.5%

十一、猪大肠杆菌病

仔猪大肠杆菌病是由病原性大肠杆菌引起的仔猪肠道传染