

## 第二章 牛羊病

### 一、牛、羊口蹄疫

口蹄疫是由口蹄疫病毒引起牛、羊、猪等偶蹄兽的一种急性、发热和高度接触性的传染病。系人畜共患病。

上虞县家畜口蹄疫始发于1980年1月底，县食品公司曹娥生猪仓库暴发生猪口蹄疫，疫源很快扩散到农村，病原毒型为乙型（O型）口蹄疫。同年3月1日发现牛口蹄疫，1981年4月28日发现羊口蹄疫，最后一个疫点是1984年4月19日蒿坝公社大堡大队3头牛发病。全县本病流行范围为3个公社6个大队，历年共有17头牛、羊发病，其中牛15头，羊2头。

皂湖公社倪家堡大队第一生产队牛舍附近的2头肉猪，于1980年2月26日发生口蹄疫。3月1日该生产队1头水牛出现精神不振，食欲减退、流口水等症状，经县兽医站检查发现，口腔内有水泡及烂斑，确诊为口蹄疫，为防止疫病扩散，该牛进行了扑杀深埋处理。同时针对疫情采取了防制措施，将其他牛立即转移隔离，从而控制了疫情。蒿坝公社同兴大队一农户家有肉猪2头，山羊2头，长期同舍饲养，1981年4月27日肉猪发生口蹄疫，第2天山羊也发生了口蹄疫。

据历年来本病发生情况，牛、羊都是经过猪传染的，先发生于猪后感染给牛、羊。本病发病在冬春两季，天气寒冷，

晴天牛晒太阳取暖，加上疫区有放养猪习惯，病猪到处排毒，使牛接触后感染发病。羊发病是因猪、羊同舍饲养，直接接触感染发病。本病因是烈性传染病，一旦发现，立即扑杀处理，故疫情得到了控制。

**牛、羊口蹄疫历年发病情况表**

单位：头

| 流行时间 |   |    | 流 行 地 区 |     | 发 病 数 |     |   | 死 亡 数 |
|------|---|----|---------|-----|-------|-----|---|-------|
| 年    | 月 | 日  | 公社      | 大队  | 合计    | 其 中 |   |       |
|      |   |    |         |     |       | 牛   | 羊 |       |
| 1980 | 3 | 1  | 皂湖      | 倪家堡 | 1     | 1   |   |       |
| 1980 | 3 | 12 | 皂湖      | 蔡蒋  | 1     | 1   |   | 1     |
| 1980 | 3 | 27 | 蒿坝      | 穗丰  | 4     | 4   |   |       |
| 1981 | 4 | 28 | 蒿坝      | 同兴  | 2     |     | 2 |       |
| 1983 | 1 | 23 | 江山      | 南穴  | 4     | 4   |   | 1     |
| 1984 | 2 | 16 | 蒿坝      | 大堡  | 2     | 2   |   |       |
| 1984 | 4 | 19 | 蒿坝      | 大堡  | 3     | 3   |   |       |
| 合 计  |   |    | 3       | 6   | 17    | 15  | 2 | 2     |

## 二、牛白血病

牛白血病是牛的一种慢性肿瘤性疾病，其特征为淋巴样细胞恶性增生，进行性恶病质和高度病死率。病原为牛白血病病毒。

牛白血病在上虞很少见，仅见2例。1981年，丁宅公社应山大队1头9岁黄牛发生白血病。该牛2年前肩前淋巴结已肿胀如鸡卵大，4月中旬春耕时拉血痢、带粘液，后淋巴结逐渐