

通常经过健康牛口腔粘膜感染，尤其是粘膜破损的更易发生。  
本病症状特异，较易诊断。

**牛放线菌病历年发病情况表**

单位：头

| 年 份  | 乡（镇） | 村   | 发 病 数 |
|------|------|-----|-------|
| 1977 | 通明   | 前进  | 1     |
| 1980 | 下管   | 马安  | 1     |
| 1985 | 陈溪   | 丰岙  | 1     |
| 1985 | 陈溪   | 庙下  | 1     |
| 1985 | 陈溪   | 浪潼  | 2     |
| 1985 | 路东   | 梁家山 | 1     |
| 合 计  | 4    | 6   | 7     |

## 十、奶牛结核病

结核病是由结核杆菌引起人、畜共患的一种慢性传染病。其特征是进行性消瘦，肺脏形成结核结节和干酪样坏死病灶。

上虞县畜牧兽医站于1985年和1987年前后两次用结核菌素点眼，皮内注射变态反应法，对全县存栏奶牛进行结核病普查。后经抽样病理解剖证明与普查结果完全相符，同时发现高温天气用皮内变态反应法要影响检测正确性。因条件所限检出的阳性病牛未作处理，自然淘汰。

### 1985年奶牛结核病普查情况表

单位：头、%

| 单 位       | 存 栏 | 阴 性 | 阳 性 | 阳 性 率 |
|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 三汇乡伟明村张金记 | 28  | 11  | 16  | 57.14 |
| 三汇乡陶堰供销社  | 4   | 3   | 1   | 25    |
| 华镇乡巨兴村蒋志毛 | 14  | 6   | 7   | 50    |
| 华镇乡巨兴村章春潮 | 2   | 1   | 1   | 50    |
| 沥东乡奶牛场    | 40  | 16  | 21  | 52.50 |
| 县 畜 牧 场   | 12  | 8   | 3   | 25    |
| 合 计       | 100 | 45  | 49  | 49    |

### 1987年奶牛结核病普查情况表

单位：头、%

| 单 位       | 存 栏 | 阴 性 | 阳 性 | 阳 性 率 |
|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 县 畜 牧 场   | 10  | 6   | 2   | 20    |
| 沥东乡奶牛场    | 22  | 7   | 9   | 40.91 |
| 华镇乡巨兴村蒋志毛 | 20  | 12  | 4   | 20    |
| 三汇乡伟明村张金记 | 34  | 24  | 6   | 17.65 |
| 合 计       | 86  | 49  | 21  | 24.42 |

## 十一、奶牛副结核病

牛副结核病是由副结核分枝杆菌引起牛的一种慢性传染病。其特征是长期顽固性腹泻，畜体极度消瘦，故又名牛副结核肠炎。

1987年12月县畜禽防检站用副结核菌素皮内注射变态反应法对全县存栏奶牛进行副结核病普查。结果附表：