

1985年奶牛结核病普查情况表

单位：头、%

单 位	存 栏	阴 性	阳 性	阳 性 率
三汇乡伟明村张金记	28	11	16	57.14
三汇乡陶堰供销社	4	3	1	25
华镇乡巨兴村蒋志毛	14	6	7	50
华镇乡巨兴村章春潮	2	1	1	50
沥东乡奶牛场	40	16	21	52.50
县 畜 牧 场	12	8	3	25
合 计	100	45	49	49

1987年奶牛结核病普查情况表

单位：头、%

单 位	存 栏	阴 性	阳 性	阳 性 率
县 畜 牧 场	10	6	2	20
沥东乡奶牛场	22	7	9	40.91
华镇乡巨兴村蒋志毛	20	12	4	20
三汇乡伟明村张金记	34	24	6	17.65
合 计	86	49	21	24.42

十一、奶牛副结核病

牛副结核病是由副结核分枝杆菌引起牛的一种慢性传染病。其特征是长期顽固性腹泻，畜体极度消瘦，故又名牛副结核肠炎。

1987年12月县畜禽防检站用副结核菌素皮内注射变态反应法对全县存栏奶牛进行副结核病普查。结果附表：

1987年奶牛副结核病普查情况表

单位：头%

单 位	存 栏	阴 性	阳 性	阳 性 率
县 畜 牧 场	10	8	0	
沥东乡奶牛场	22	12	4	18.18
华镇乡巨兴村蒋志毛	20	13	3	15
三汇乡伟明村张金记	34	24	6	17.65
合 计	86	57	13	15.12

十二、山羊传染性胸膜肺炎

山羊传染性胸膜肺炎又称“烂肺炎”，是山羊特有的高度接触性传染病。临床特征为高热、咳嗽、肺和胸膜发生浆液性和纤维蛋白性炎症，病原是丝状霉形体。

1984年11月县农林局兽医站从四川省万源县引入“板角”山羊259头，由于路途远，加上阴雨连绵，天气寒冷，火车车皮上羊群密集拥挤，其中有26头出现发热、咳嗽、腹泻，鼻流脓液，口腔发生溃烂等症状。途中死亡11头。到海涂饲养后，怀孕母羊大批流产，仍陆续发生死亡，仅剩77头，最后在陈溪、覆卮作扶贫饲养后全部淘汰死亡。病死羊剖检：胸腔有淡黄色液体，两侧有纤维蛋白性肺炎，肝变区凸出于肺表，切面呈大理石样，胸膜变厚而粗糙，有白色纤维蛋白层附着，直至胸膜与肋膜，心包发生粘连，支气管淋巴结和纵膈淋巴结肿大，切面多汁并有溢血。

1986年9月县土产公司从湖南引进“马头”山羊80头。陆