

### 1981年耕牛锥虫病普查情况表

单位：头、%

| 单 位   | 受 检 数 | 阴 性  | 阳 性 | 阳 性 率 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 下 管 区 | 1651  | 1584 | 67  | 4.1   |
| 章 镇 区 | 2755  | 2701 | 54  | 2     |
| 丰 惠 区 | 1154  | 1108 | 46  | 4     |
| 百 官 区 | 500   | 483  | 17  | 3.4   |
| 东 关 区 | 491   | 487  | 4   | 0.8   |
| 小 越 区 | 202   | 172  | 30  | 14.9  |
| 合 计   | 6753  | 6535 | 218 | 3.2   |

### 1982年耕牛锥虫病普查情况表

单位：头、%

| 单 位   | 受 检 数 | 阴 性  | 阳 性 | 阳 性 率 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 下 管 区 | 1428  | 1358 | 53  | 3.7   |
| 章 镇 区 | 2380  | 2272 | 108 | 4.5   |
| 丰 惠 区 | 911   | 810  | 101 | 11.1  |
| 百 官 区 | 357   | 304  | 53  | 14.8  |
| 东 关 区 | 537   | 441  | 96  | 17.9  |
| 小 越 区 | 409   | 328  | 81  | 19.8  |
| 松 厦 区 | 289   | 180  | 109 | 37.7  |
| 合 计   | 6311  | 5710 | 601 | 9.5   |

## 十五、牛焦虫病

焦虫病又称血孢子虫病，病原体是无色素血孢子虫—焦虫，寄生在红细胞内，通过蜱传播引起家畜的焦虫病。

1962年7月，上虞县畜牧场为节约饲料，牛到山上放牧，25天后，1头纯种奶牛食欲下降，后废绝，有发热症状，拉血尿后死亡。4天后又陆续有5头奶牛发病，因见到山上放牧时牛蜱很多，怀疑是焦虫病。经采血送余姚县实验室诊断，发现有焦虫虫体，确诊为焦虫病，用黄色素治疗后康复。并采取立即停止放牧，实行舍养，并消灭牛体上蜱，此后场内未见焦虫病牛发生。

## 十六、牛疥癣病

牛疥癣病是疥螨寄生于牛体表或表皮内引起的慢性皮肤病，以接触感染，患畜剧烈痒感，以及各种类型的皮肤炎为特征。

牛疥癣病是上虞常见的体外寄生虫病，特别是水牛发生较多、黄牛少见。本病是由于健畜接触患畜或通过畜舍和用具等而受感染的，但病牛是主要传染源。一般呈散发性或地方性流行，病变头部和颈部多见，严重感染时也发生于身体的其他部位。据历年发病情况统计，全县共有9388头牛发病，其中因感染严重而形成痂皮、龟裂和脓疮，使畜体日渐消瘦而死亡17头。在秋末冬初时期，尤其是阴雨天气蔓延最广，发病最多，夏季阳光照射充分和干燥，不利于虫卵、幼虫发育，故发病较少，这时病牛症状减轻或完全康复。

本病以预防为主，防治结合，加强饲养管理，增加光照时间，保持皮肤清洁。在治疗上，用敌百虫溶液外擦疗效较好，且安全可靠，六、七十年代时也有用六六六、硫磺等药物，但用