

七、牛巴氏杆菌病

牛巴氏杆菌病又叫“牛出败”，是由牛巴氏杆菌引起的一种急性、热性传染病。

上虞县发生并确诊为牛巴氏杆菌病仅见一例。1984年6月23日晚上，县畜牧场1头奶牛突然死亡，县畜牧兽医站化验人员前往处理，牛尸僵完全，口、鼻、肛门、阴户等自然孔流血，血凝不良，在排除了牛炭疽后予以解剖，发现牛心脏扩大，心室内充满大量凝血块，心冠脂肪和肝脏表面有出血点，肠粘膜脱落。据饲养员反映该牛近几天食欲不好，以为是牛吃进铁钉所致。经无菌采集心血培养发现牛巴氏杆菌。

据县档案馆《1953年畜牧兽医工作总结》提到，发生牛出败死亡8头，然无发病地点记录。

八、牛、羊破伤风

破伤风又称“强直症”，俗名“锁口风”。是由破伤风梭菌引起的一种人畜共患的急性、创伤性、中毒性传染病，病原菌广泛存在于土壤中和尘土及粪便中，由伤口进入引起发病。

牛、羊破伤风在上虞县是一种常见病，呈散发流行。据统计全县历年来共有639头牛、羊发生破伤风，其中死亡529头，死亡率占发病数的82.8%。牛发病160头，死亡117头，死亡率73%，羊发病479头，死亡412头，死亡率86%。

本病主要有阉割、外伤、分娩、断脐等因素引起，死亡率较高，以春秋两季多发。1982年9月，横塘公社黄倪严大队1头公水牛，阉割后第6天开始进食减少，出现吞咽困难，流口