

三、雏鸭病毒性肝炎

雏鸭病毒性肝炎是一种由滤过性病毒引起的雏鸭急性、高度致死性传染病。

根据上虞县畜禽防检站化验室资料，雏鸭病毒性肝炎于1984年在上虞首发并开始流行：4月16日，谢塘镇养鸭专业户陈某饲养开产蛋鸭1000羽，雏鸭500羽（从禹丰孵坊购入），雏鸭18日龄起每日以5—8羽的数量死亡，最多一天死亡25羽，而蛋鸭未见发病。主要临床表现为不食、呆立、闭眼，1—3天后突然痉挛而死（角弓反张），剖检主要变化是肝肿大表面有淡红色出血斑块。病料经细菌培养阴性，用抗生素、病毒灵等药物治疗未能控制疫情，后经用余姚市免疫蛋黄注射液治疗，至4月21日（23日龄）停止死亡，共死亡186羽，死亡率为37.2%。

1985年3月28日，地处滨笪乡的上虞县茶场饲养苗鸭1000羽（县牧场孵坊购入），15日龄起发生同样疫情，经余姚市兽医站解剖检验诊断为雏鸭病毒性肝炎，用免疫蛋黄注射液治疗疫情得到控制，共死亡310羽，由于早春天气转冷，又给雏鸭不适当地过早下水，至21日龄起再次发病，经浙江省畜禽防检站和县畜禽防检站现场调查、剖检及实验室诊断确定为雏鸭病毒性肝炎并发禽伤寒，继续注射免疫蛋黄液未能控制疫情。时值该场兽医调离，致使剩下的690羽雏鸭全部死光。该场第二年（1986年）3月份又饲养苗鸭600羽，由于卫生防疫措施没有做好，12日龄起暴发雏鸭病毒性肝炎，至18日龄死亡率达95%以上，后所剩数10羽生长滞缓予以淘汰。

1989年全县畜禽疫病回顾性调查中发现。雏鸭病毒性肝炎从1984年起每年均有不同程度发病，主要在小越、松厦、丰惠、章镇四个区另星散发，涉及21个乡81个村，未形成大面积流行。发病主要集中在早春3—4月孵化季节，以5—25日龄雏鸭易感，10—18日龄死亡率最高，有并发症出现时，死亡率可达100%，30日龄以上未见发病。

近年来，由于养鸭场户对本病有所认识，从注重雏鸭的饲养管理，环境卫生和早期治疗着手，发病率和死亡率呈下降趋势。

1984—1989年全县雏鸭病毒性肝炎发病情况表

单位：羽、%

年 份	饲养量	发病数	发病率	死亡数	死亡率
1984	442944	2360	0.53	2258	0.51
1985	426400	4185	0.98	3985	0.93
1986	390240	3856	0.99	3560	0.91
1987	368130	2543	0.91	2238	0.61
1988	469650	2835	0.69	2350	0.50
1989	423640	2365	0.56	2143	0.51

四、鸡 痘 (FP)

鸡痘是一种痘病毒侵入鸡体内而引起的高度接触性传染病。在上虞流行的鸡痘以“皮肤型”为主，俗称“鸡头疮”。大部分发生在立秋后大鸡头部的冠、肉髯和眼角等处皮肤出现灰白色或黄褐色突出皮表大如绿豆的结节状痘痂。很久以来，在农村