

45%发生过不同程度的慢性呼吸道病，大多数鸡曾用抗生素治疗而康复，很少死亡，其中以进口新药北里霉素药效最佳。

六、鸡马立克氏病（MD）

鸡马立克氏病是由一种疱疹病毒引起的鸡的传染性肿瘤病。病鸡的分泌物、排泄物，特别是脱落的羽毛、皮屑都是传染源，通过空气和消化道传染。

在上虞MD过去很少发生，八十年代起陆续有6个专业养鸡场户发病，累计死亡1572羽，单就死鸡造成的经济损失就达9700元之余，还不包括消瘦而被淘汰的病鸡，饲料的消耗及屠宰中出现的残次品所造成的损失。

1983年4月15日驻虞某部连队鸡场首例发生鸡马立克氏病，该场于2月20日从上海金山购入苗鸡1000羽，50日龄起有25%的鸡发生典型的翅肢“劈叉式”神经型马立克氏病，经县畜禽防检站现场剖检发现病鸡单侧或双侧坐骨N和臂N丛水肿，神经横纹消失，病鸡全部淘汰处理。此后于1985、1988和1989年全县分别有五个养鸡场户五批肉鸡发生不同类型的鸡马立克氏病（附发病表）。

鸡马立克氏病无药物可治，但近年来已研制出疫苗用以预防鸡传染性肿瘤病——马立克氏病，这是兽医免疫科技的重大突破。1987年春季，县畜牧兽医总站开始对上虞县牧场孵坊注射马立克氏病疫苗。此后，食品公司、百官虎逃弄章焕明等孵坊相继使用马立克氏病疫苗。1987年注射72000羽，1988年注射1,025,000羽，1989年注射1,131,500羽。并强调和推广在孵

上虞县MD发病情况表

单位：羽

时 间	鸡 场 名 称	饲养量	发病数	MD类型
1983、4	驻虞某部连队鸡场	1000	250	神经型
1985、12	长山保二村徐某专业户	2000	1600	神经型、 内脏型
1988、5	丰惠镇朱某专业户	2500	72	神经型
1989、8	丰惠镇倪某专业户	450	57	眼 型
1989、9	龙浦县家畜改良站	400	46	神经型、 内脏型
1989、10	联丰联海村孟某专业户	1000	58	内脏型

坊、养鸡场进行福尔马林熏蒸消毒，以防止和消灭马立克氏病毒的扩散。

在全市种鸡场疫病普查中，1988年由县牧场、食品公司种鸡场送检血清样246份，应用琼扩试验进行MD血清学诊断，未出现阳性反应。1989年抽样时，由县牧场、食品公司、县农科所种鸡场送检血清样共86份，结果有12份血清出现阳性反应，MD阳性率为13.95%。上虞县近年来解坊注射的是“火鸡 疱疹弱毒疫苗”，注后所产生的抗体只起到干扰MD病毒的作用而不是产生抗MD抗体，故上述检测出现的阳性反应系部分鸡感染过MD野毒所致。

七、鸡传染性喉气管炎（LT）

1986—1987年初冬时节，丰惠、东关、滨笕三乡（镇）中有三个养鸡专业户发生鸡传染性喉气管炎，病初起时有部分鸡发生呼吸困难，3—5天迅速在全群蔓延。病鸡精神萎顿、蹲地头下垂，且有头颈向前向上张口尽力吸气的特殊姿势，并发