

上虞县MD发病情况表

单位：羽

时 间	鸡 场 名 称	饲养量	发病数	MD类型
1983、4	驻虞某部连队鸡场	1000	250	神经型
1985、12	长山保二村徐某专业户	2000	1600	神经型、 内脏型
1988、5	丰惠镇朱某专业户	2500	72	神经型
1989、8	丰惠镇倪某专业户	450	57	眼 型
1989、9	龙浦县家畜改良站	400	46	神经型、 内脏型
1989、10	联丰联海村孟某专业户	1000	58	内脏型

坊、养鸡场进行福尔马林熏蒸消毒，以防止和消灭马立克氏病毒的扩散。

在全市种鸡场疫病普查中，1988年由县牧场、食品公司种鸡场送检血清样246份，应用琼扩试验进行MD血清学诊断，未出现阳性反应。1989年抽样时，由县牧场、食品公司、县农科所种鸡场送检血清样共86份，结果有12份血清出现阳性反应，MD阳性率为13.95%。上虞县近年来解坊注射的是“火鸡 疱疹弱毒疫苗”，注后所产生的抗体只起到干扰MD病毒的作用而不是产生抗MD抗体，故上述检测出现的阳性反应系部分鸡感染过MD野毒所致。

七、鸡传染性喉气管炎（LT）

1986—1987年初冬时节，丰惠、东关、滨笕三乡（镇）中有三个养鸡专业户发生鸡传染性喉气管炎，病初起时有部分鸡发生呼吸困难，3—5天迅速在全群蔓延。病鸡精神萎顿、蹲地头下垂，且有头颈向前向上张口尽力吸气的特殊姿势，并发

出喘鸣声，农村俗称“哮喘病”。剖检喉头、气管粘膜充血肿胀有出血点，气管内有多量血性分泌物。经用链霉素、多种维生素饮水治疗疗效不显，病症轻者在10—12天恢复，重症呼吸道阻塞，鸡冠发紫窒息死亡。以上三个鸡场共死亡88羽，死亡率为8.38%。

鸡传染性喉气管炎病原是一种类疱疹病毒。上三户鸡场发病起因为鸡舍通风不良、潮湿和鸡群密度过大所致。本病在全县范围内发病不多。未引起重视。迄今尚未推广鸡传染性喉气管炎弱毒疫苗预防注射。（附传喉发病表）

鸡传染性喉气管炎发病情况表

单位：羽、%

时 间	地点(专业户)	饲养量	发病数	发病率	死亡数	死亡率	备 注
1986、10、27	丰惠镇宋某	250	125	50	45	18	60日龄海星肉鸡
1987、9、30	东关凌村王某	500	154	31	27	5	海星(产蛋) 肉用种鸡
1987、11、15	滨笕笕桥沈某	300	96	32	16	5	伊莎蛋鸡(产蛋)
小 计		1050	475	45	88	8	

八、鸡包涵体肝炎 (IBH)

本病又叫传染性贫血、出血综合症，是由鸡腺病毒引起的鸡的一种急性传染病，多发生在5周龄左右的仔鸡。病鸡精神不振，下痢，粪便呈白色水样，多数不经治疗而急性死亡，轻度发病鸡经2—3天可恢复正常。

在上虞1988年1月以前IBH没有作为一种鸡病提出，因其临床症状与IBD（鸡传染性法氏囊病）很相似，故一直未知其